

MUSCUREL®

thiocolchicoside

Traitement d'appoint efficace (à partir de 16 ans) de la

CONTRACTURE MUSCULAIRE DOULOUREUSE

(EN PATHOLOGIE RACHIDIENNE AIGÛE)

une excellente efficacité avec un faible risque d'effets secondaires

**Le patient peut continuer à vaquer librement
à ses activités journalières.**

Action médullaire sans agir au niveau central

- pas d'effet sur la respiration
- pas de risque d'hypotension
- pas d'effets néfastes sur les fonctions rénales/hépatiques
- pas de risque d'addiction (comme avec les benzos)
- pas d'effets sédatifs
- pas d'interactions médicamenteuses



POSOLOGIE :

La dose recommandée et maximale est de 8 mg toutes les 12 heures (soit 16 mg par jour), de préférence après un repas.

La durée maximale du traitement est limitée à 7 jours consécutifs.

Ne pas dépasser la dose recommandée ni la durée du traitement.

Pas indiqué en dessous de 16 ans.

Ne pas utiliser chez la femme enceinte ou allaitante.

Le seul thiocolchicoside disponible en 8 mg

Moins de prises

Prix très avantageux



SCANNEZ

Pour les infos sur nos autres produits,
veuillez consulter www.dafrapharma.com
et créer votre compte personnel sur le site.

3FIMRELF_1_2023_FINAL

MUSCUREL®

thiocolchicoside



Dénouer les nœuds dans les muscles quand les douleurs vous attachent

Pour plus de souplesse sans douleur



Traitement d'appoint efficace de la
CONTRACTURE MUSCULAIRE DOULOUREUSE
(EN PATHOLOGIE RACHIDIENNE AIGÛE)
(à partir de 16 ans)



La Référence de l'Excellence

www.dafrapharma.com

MUSCUREL®

thiocolchicoside

MUSCUREL®

- supprime ou atténue considérablement la contracture d'origine centrale
- diminue la résistance passive du muscle à l'étirement
- réduit ou efface la contracture résiduelle

Le thiocolchicoside est dépourvu d'effets curarisants et ne paralyse pas le muscle. L'effet musculorelaxant est présent grâce à l'activation antagoniste des récepteurs GABA-A et une action agoniste sur les récepteurs glycinergiques situés au niveau du tronc cérébral et de la moelle épinière.

MUSCUREL® :

- **pas d'altération de la motilité volontaire**
- **évite tout risque respiratoire**
- **pas d'influence sur le système cardiovasculaire**

Très bonne efficacité et utilité dans des cas divers

- pas d'impact sur le fonctionnement des jeunes et de gens qui travaillent
- facile à utiliser – maximum 2 comprimés par 24 h
- pas d'effets secondaires au niveau respiratoire
- pas de risque d'hypotension
- pas d'effet / suppression au niveau du cerveau
- pas d'effets secondaires au niveau rénale / hépatique
- pas d'addiction

NE PAS UTILISER

- chez la femme enceinte ou allaitante
- en cas d'allergie à la colchicine ou à l'un des composants contenus dans ce médicament

INDICATION

MUSCUREL® est utilisé chez les adultes et les adolescents de plus de 16 ans, comme traitement d'appoint des contractures musculaires douloureuses. Il est utilisé pour des affections douloureuses aiguës liées à la colonne vertébrale.



Les contractures musculaires douloureuses avec une origine rachidienne

après surentraînement sportif - après utilisation excessive du muscle - surmenage
lors d'un traumatisme - une contusion - une élévation
le lumbago - le torticolis

DÉNOUER LES NŒUDS DANS LES MUSCLES QUAND LES DOULEURS VOUS ATTACHENT

Effets indésirables éventuels : troubles digestifs – douleurs à l'estomac. En cas de diarrhée, la posologie peut être réajustée. En cas d'une crise convulsive, le traitement doit être arrêté.

Conduite de véhicules et utilisation de machines : Ce médicament peut provoquer de la somnolence. Ce risque augmente en cas de consommation de l'alcool pendant le traitement.

Précaution : Ne pas dépasser la dose recommandée maximale (16 mg/par jour) ni la durée de traitement maximale de 7 jours consécutifs. Des doses supérieures aux doses recommandées ou l'utilisation à long terme doivent toujours être évitées

Muscurel® est un médicament délivré sur ordonnance.

Pour le RCP complet, veuillez scanner ce code QR.

