

AMIFER®

fer + acide folique + vit B12

Une santé de fer pour tous les âges
Grâce à ce régénérateur sanguin

TRAITEMENT ET PRÉVENTION DE CARENCE EN FER ET EN ACIDE FOLIQUE

INDICATIONS

Pour les personnes souffrant de carences en fer (ferriprive) ou dont l'alimentation est pauvre en fer

Avant et pendant la grossesse

En cas d'anémie ferriprive post-partum

En cas d'anémie sévère ou modérée

A titre prophylactique afin d'éviter une déficience en fer ou en acide folique

LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT LES SUPPLÉMENTS FERRIQUES

0 à 13 ans	5 ml Amifer® / jour
À partir de 14 ans	10 ml Amifer® / jour
Grossesse et allaitement	10 ml Amifer® / jour

TRAITEMENT DE L'ANÉMIE FERRIPRIVE MODÉRÉE À SÉVÈRE

Adolescents (14-18 ans) Adultes (≥ 19 ans) Grossesse et allaitement	20 ml Amifer® / jour
---	----------------------

Durée de traitement recommandée: min. 3 mois

L'AMI DE TOUTE LA FAMILLE

Pour les infos sur nos autres produits,
veuillez visiter www.dafrapharma.com
et créer votre compte personnel sur le site.



SCANNEZ

AMIFER®

fer + acide folique + vit B12



Carences en fer? Le régénérateur sanguin s'en occupe!



La Référence de l'Excellence
www.dafrapharma.com

AMIFER®

fer + acide folique + vit B12



Indication	Dose Unitaire
<p>Lignes directrices concernant les suppléments ferriques:</p> <p>Nourrissons (0-12 mois) Enfants (1-13 ans) Adolescents (14-18 ans) Adultes (≥ 19 ans) Grossesse et allaitement</p>	<p>30 mg de fer/par jour - 5 ml 30 mg de fer/par jour - 5 ml 60 mg de fer/par jour - 10 ml 60 mg de fer/par jour - 10 ml 60 mg de fer/par jour - 10 ml</p>
<p>Lignes directrices en vue du traitement de l'anémie ferriprive modérée à sévère:</p> <p>Adolescents (14-18 ans) Adultes (≥ 19 ans) Grossesse et allaitement</p>	<p>120 mg de fer/par jour - 20 ml 120 mg de fer/par jour - 20 ml 120 mg de fer/par jour - 20 ml</p>
<p>Il faut bien agiter avant l'emploi. Ne consommez pas de lait, ni d'autres produits laitiers, ni de thé avec AMIFER®, ou attendez au moins deux heures avant de les consommer. Pour éviter tout déconfort gastrique, il est recommandé de prendre ce médicament immédiatement après un repas. La dose quotidienne se prend de préférence chaque jour à la même heure.</p>	
<p>Durée de traitement recommandée: min. 3 mois</p>	

IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

Ingrédients (Quantité/5 ml):

Actifs: Citrate ferrique ammoniacal (172,41 mg (correspondant à 30 mg de fer élémentaire)), Acide folique (2,5 mg), Vitamine B12 (cyanocobalamine) (0,02 mg).

Excipients: Sorbate de potassium (7,50 mg), Chlorure de sodium (0,600 mg), Acide citrique anhydre (2,500 mg), Arôme orange (70,796 mg), Arôme vanille (2,269 mg), Arôme menthe (17,916 mg), Sucralose (3,50 mg), Ethanol (0,1805 ml), Glycerol (750,00 mg), Eurocert Ponceau 4R (2 mg) Sorbitol (Ad 5,000 ml), Eau distillée.

INDICATIONS

AMIFER® est indiqué:

- ✓ Pour les personnes souffrant de déficience en fer (ferriprive) ou dont l'alimentation est pauvre en fer,
- ✓ Pour les femmes envisageant une grossesse ou pendant la grossesse,
- ✓ En cas d'anémie ferriprive post-partum,
- ✓ En cas d'anémie sévère ou modérée,
- ✓ A titre prophylactique afin d'éviter une déficience en fer ou en acide folique.

CONTRE-INDICATIONS

AMIFER® est contre-indiqué pour les personnes allergiques à l'un des ingrédients dont il se compose. AMIFER® ne doit pas être administré en cas d'accumulation ferrique (hémochromatose, hémosidérose, hémolyse chronique) et de problèmes inhérents à la consommation de fer (anémies sidéroblastiques, anémies saturniques, thalassémies).

Il existe une contre-indication absolue en cas d'anémie mégaloblastique résultant d'une déficience isolée en vitamines B12 (suite, par exemple, à une déficience concernant un facteur intrinsèque) ou d'une déficience isolée en acide folique.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES

Vous devez demander l'avis de votre médecin, avant de prendre ce médicament

- ✓ Si vous subissez fréquemment des transfusions sanguines
- ✓ Si vous présentez un désordre sanguin
- ✓ Si vous souffrez d'épilepsie
- ✓ Si vous souffrez de problèmes du système digestif ou de l'estomac

GROSSESSE -ALLAITEMENT

AMIFER® peut être administré sans le moindre risque pendant la grossesse et l'allaitement.

INTERACTIONS AVEC D'AUTRES MÉDICAMENTS OU DES ALIMENTS

Certains médicaments sont incompatibles avec le sirop à base de citrate de ferrique ammoniacal et d'acide folique. Votre docteur en est bien conscient et modifiera votre traitement si nécessaire. Toutefois, il est extrêmement important que vous signaliez à votre médecin tous les médicaments que vous prenez, y compris ceux disponibles en vente libre.

L'administration simultanée d'anti-acides, de phosphates, de carbonates, d'oxalates, de calcium et de certains autres antibiotiques (tétracyclines) risque de nuire l'effet du fer. L'effet de la pénicillamine, des fluoroquinolones, de l'étidronate de sodium, du clodronate de sodium et de certains antibiotiques (tétracyclines), du méthotrexate, de la triméthoprimine et de la pyriméthamine risque également d'être réduit.

DURÉE D'UTILISATION

Continuez à prendre ce sirop jusqu'à ce que le médecin vous conseille d'arrêter.

Rappel: ce médicament vous a été prescrit personnellement. Ne proposez jamais ce médicament à d'autres personnes, car il se pourrait qu'il ne leur convienne pas, même si elle souffre de symptômes identiques aux vôtres.

Que faire en cas d'oubli d'une dose? Ne vous tracassez pas si vous avez oublié une dose. Prenez la dose suivante à l'heure habituelle. Si vous oubliez constamment votre sirop, parlez-en à votre médecin.

EN CAS DE SURDOSAGE

En cas de surdosage, contactez immédiatement votre médecin ou pharmacien.

EFFETS INDÉSIRABLES

A l'instar de tous les médicaments, il se peut qu'AMIFER® entraîne des effets secondaires chez certains patients. Ces effets incluent des nausées, des vomissements, de la constipation, des diarrhées, des selles foncées sont habituelles et sans aucun danger. Les réactions allergiques sont rares. Si vous souffrez beaucoup ou développez d'autres problèmes inhabituels pendant que vous prenez ce médicament, signalez-le à votre médecin.

CONSERVATION

A conserver à une température ne dépassant pas 30°C, dans l'emballage original, à l'abri de la lumière. Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. N'utilisez jamais ce médicament quand la date de péremption imprimée sur l'emballage (Exp.) est dépassée. La date fait référence au dernier jour du mois.



**Pour le RCP complet,
veuillez scanner ce code QR.**