

AMIFER® SIROP	AMIFER® JUNIOR SIROP	AMIFER® FORTE COMPRIMÉS																		
Flacon de 200 ml avec par 5 ml: 30 mg fer élémentaire 2,50 mg acide folique 0,02 mg vitamine B12 Goût d'orange, menthe et vanille	Flacon de 150 ml avec par 5 ml: 50 mg fer élémentaire Goût crème	Boîte de 30 comprimés, par comprimé: 100 mg fer élémentaire 0,350 mg acide folique																		
La prévention et le traitement des carences en fer de différentes origines Déficience en Fer (ferriprive), alimentation trop pauvre en fer Correction / traitement de l'anémie ferriprive (taux d'hémoglobine en dessous de la normale)																				
Pour les femmes qui se préparent à concevoir ou les femmes enceintes En cas d'anémie ferriprive postpartum Prévenir la déficience en fer, en acide folique et en Vit B12	Nouveau-nés et enfants Peut aussi être utilisé chez l'adulte	Adolescents et adultes qui préfèrent les comprimés																		
Carences en fer		1 comprimé 1 à 2 fois par jour																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tranches d'âge</th> <th>Quantités par jour</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 - 13 ans</td> <td>5 ml</td> </tr> <tr> <td>Adolescents & adultes</td> <td>10 ml</td> </tr> <tr> <td>Grossesse & allaitement</td> <td>10 ml</td> </tr> </tbody> </table>	Tranches d'âge		Quantités par jour	0 - 13 ans	5 ml	Adolescents & adultes	10 ml	Grossesse & allaitement	10 ml	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tranches d'âge</th> <th>Quantités par jour</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nourrissons - 2 ans</td> <td>1/4 cuillère</td> </tr> <tr> <td>2 - 5 ans</td> <td>1/4 cuillère, 1 à 2 fois</td> </tr> <tr> <td>6 - 12 ans</td> <td>1 cuillère, 1 à 2 fois</td> </tr> <tr> <td>Adolescents & adultes</td> <td>2 cuillères</td> </tr> </tbody> </table>	Tranches d'âge	Quantités par jour	Nourrissons - 2 ans	1/4 cuillère	2 - 5 ans	1/4 cuillère, 1 à 2 fois	6 - 12 ans	1 cuillère, 1 à 2 fois	Adolescents & adultes	2 cuillères
Tranches d'âge	Quantités par jour																			
0 - 13 ans	5 ml																			
Adolescents & adultes	10 ml																			
Grossesse & allaitement	10 ml																			
Tranches d'âge	Quantités par jour																			
Nourrissons - 2 ans	1/4 cuillère																			
2 - 5 ans	1/4 cuillère, 1 à 2 fois																			
6 - 12 ans	1 cuillère, 1 à 2 fois																			
Adolescents & adultes	2 cuillères																			
Anémie: Doublez la dose																				
AMIFER® existe aussi en forme IV																				
Difficultés à prendre le fer par voie orale, problèmes d'absorption gastro-intestinale En cas de néphropathie chronique Le patient dialysé Patient avec une insuffisance cardiaque Hémorragies postopératoires graves Quand les pertes sont plus importantes que la capacité d'absorption par voie orale Lorsque la situation clinique du patient nécessite un apport rapide en fer																				

AMIFER®

AMIFER FORTE comprimés

AMIFER JUNIOR sirop

AMIFER sirop



Le fer par voie orale, adapté pour tous les patients

LA SANTÉ DE FER POUR TOUS LES AGES

La prévention et le traitement des carences en fer
de différentes origines

La carence / la déficience en fer s'installe bien avant l'anémie ferriprive

Une fatigue générale qui dure, un manque d'énergie

Perte d'efficacité / de performance, problèmes de concentration

Perte de force musculaire

Troubles de sommeil, maux de tête et vertiges

Frilosité, vulnérabilité accrue aux infections, inflammations

Naissances prématures ou déficit de poids à la naissance de l'enfant

PENSEZ À UNE CARENCE EN FER

(même sans anémie)



SCANNEZ

Pour les infos sur nos autres produits, veuillez consulter www.dafrapharma.com et créer votre compte personnel sur le site.



La Référence de l'Excellence

www.dafrapharma.com

AMIFER®

AMIFER® SIROP	AMIFER® JUNIOR SIROP	AMIFER® FORTE COMPRIMÉS
Flacon de 200 ml avec par 5 ml: 30 mg fer élémentaire 2,50 mg acide folique 0,02 mg vitamine B12 Goût d'orange, menthe et vanille Gobelet doseur	Flacon de 150 ml avec par 5 ml: 50 mg fer élémentaire Contient du saccharose et du sorbitol Goût crème Cuillère avec indications (1,25 ml - 2,5 ml - 5 ml)	Boîte de 30 comprimés, par comprimé: 100 mg fer élémentaire 0,350 mg acide folique
La prévention des carences en fer et en acide folique. Ce sirop est indiqué pour des personnes souffrant de carence en fer ou dont l'alimentation est faible en fer, pendant la grossesse , après un accouchement en prévention de l'anémie et d'une carence en fer et en acide folique.	Dans le traitement et la prévention des carences en fer de différentes origines et pour des personnes souffrant d'une anémie due à une carence en fer, ou pour traiter une carence en fer au cours de l'enfance ou pendant la grossesse et l'allaitement .	Utilisé dans le traitement de toutes les carences en fer de causes différentes, dans la prévention et le traitement des carences en fer et en acide folique durant la grossesse et l'allaitement et dans le traitement de l'anémie ferriprive .

Ne prenez pas les formes orales d'AMIFER® (consultez les RCP pour des informations complètes)

- Si vous êtes hypersensible (allergique) au Fer ou à l'un de ses composants.
- En cas d'accumulation ferrique (surcharge de fer) (hémochromatose, hémosidérose, hémolyse chronique) et de problèmes inhérents à la consommation de fer (anémies sidéroblastiques, anémies de l'intoxication saturniques, thalassémies).
- En cas d'anémie non ferriprive
- En cas de conditions exigeant de recevoir fréquemment et continuellement des transfusions sanguines,
- En cas d'anémie mégalo-blastique résultant d'une carence isolée en vitamine B12 ou d'une carence isolée en acide folique.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Les formes orales d'AMIFER® peuvent être administrées sans le moindre risque pendant la grossesse et l'allaitement si le médecin ou le pharmacien en recommandent l'utilisation

CONDUITE OU UTILISATION DE MACHINES

Aucun effet indésirable en rapport avec la conduite ou l'utilisation de machines n'a été observé.

SURDOSAGE

En cas de surdosage, contactez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Pendant la prise de formulations de fer par voie orale, la couleur des selles peut s'obscurcir; il s'agit d'un phénomène normal qui ne nécessite aucune mesure particulière, il ne provoque pas de résultats faux positifs lors des tests de vérification de la présence de sang dans les selles, il n'est donc pas nécessaire d'interrompre le traitement lors de ce test.

EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES

Réactions allergiques, indigestion, douleur abdominale, nausées ou vomissements, sensation de brûlure dans l'estomac, la constipation, la diarrhée, le liquide amer dans la bouche, légères douleurs abdominales, démangeaisons de cloques sur la peau, éruptions cutanées, rougeurs, maux de tête, variation de la couleur des urines et des selles.

CONSERVATION

A conserver à une température ne dépassant pas les 30°C. N'utilisez pas ce médicament si la date de péremption mentionnée sur l'emballage ou la bouteille (Exp.) est dépassée.

LES BÉNÉFICES DES FORMES ORALES D'AMIFER®

AVANT (symptômes possibles de carences en fer)	APRÈS
Fatigue mentale Difficultés de concentration	Le calme et la sérénité retrouvé De nouveau pouvoir se concentrer Retrouver « l'élan » ...
Fatigue physique Manque de force et de performance	De nouveau être capable de faire des activités physiques Retrouver « l'élan »
Problèmes de concentration Diminution des fonctions cognitives	De nouveau faire un travail mental, études, performances à l'école ...
Troubles du sommeil	Dormir la nuit sans se réveiller Se réveiller en bonne forme
Maux de tête fréquentes	Moins de maux de tête
Frilosité	Mieux supporter le froid
Vulnérabilité accrue aux infections	Moins de maladies: bonne résistance
Perte de cheveux Fragilité et rainures des ongles Gerçures aux lèvres	Meilleure condition physique
Naissance prématurée Déficit de poids	Plus de chances pour avoir une grossesse sans problèmes...



LA SANTÉ DE FER POUR TOUS LES ÂGES

Pour le RCP complet, veuillez scanner ce code QR.



SCANNEZ