

Paludisme simple
chez le grand enfant et l'adulte

Co-Arinate®

artésunate, sulfaméthoxyypyrazine & pyriméthamine



SCANNEZ

Pour les infos sur nos autres produits, veuillez consulter
www.dafrapharma.com et créer votre compte personnel sur le site.

Co-Arinate® ENFANT	Co-Arinate® ADULTE
1 blister de 3 comprimés: <ul style="list-style-type: none">• 100 mg d'artésunate• 250 mg de sulfaméthoxyypyrazine• 12,5 mg de pyriméthamine	1 blister de 3 comprimés: <ul style="list-style-type: none">• 200 mg d'artésunate• 500 mg de sulfaméthoxyypyrazine• 25 mg de pyriméthamine

La dose fixe qui combine L'OBSERVANCE, L'EFFICACITÉ ET LA SÉCURITÉ
en 3 jours de traitement

1 comprimé par jour pendant 3 jours consécutifs

TRAITEMENT DE 3 JOURS avec une seule prise par 24 heures	
Enfants 20 - 40 kg 1 comp. enfant / jour	Adultes (à partir de 40 kg) 1 comp. 'adulte' / jour pendant 3 jours consécutifs
Le goût et l'odeur neutres des comprimés facilitent la prise	

Co-Arinate®

artésunate, sulfaméthoxypyrazine & pyriméthamine



ANTIPALUDIQUE UNIQUE
À DOSE FIXE COMBINÉE

La dose fixe qui
combine l'observance,
l'efficacité et la sécurité
en 3 jours de traitement



Co-Arinate®

artésunate, sulfaméthoxyypyrazine & pyriméthamine



“La réponse au critères pour un traitement efficace du paludisme simple”

- Premier CTA en dose fixe combiné
- Combinaison unique avec la sulfaméthoxyypyrazine
 - Meilleure couverture
 - Meilleure protection contre des résistances
- EFFICACITÉ INÉGALÉE: taux de guérison exceptionnellement élevé (> 99%)

Auteur principal	Étude faite à	% de guérison
Adam 2006	Sudan	97,10%
Rulisa 2007	Rwanda	96,30%
Penali 2008	RCI	100%
Sagara 2009	Mali / Rwanda / Cameroun / Sudan	98,9%
Ayede 2010	Nigeria	95,6%
Total: 2685 patients		99%

Sagara I et al. Malaria J 2009;8:63. / Rulisa S, et al. Am J Trop Med Hyg 2007;77:612-6. / Adam et al Annals of Microbiology and Antimicrobials 2006, 5:18 / Penali LK, Jansen FH. Int J Infect Dis 2008;12:430-7. / Ayede IA, et al. Malaria J 2010;9:378.

- Schizonticide et gamétocytoicide: guérison rapide + blocage de la transmission
- Formulation adaptée à la cible (enfants – adultes)
- 1 seule prise de 1 comprimé par jour (24 heures)
- EXCELLENTE TOLÉRANCE et SÉCURITÉ D’EMPLOI
- Convient pour le relai oral après le traitement parentéral du paludisme grave
- Longue durée de conservation
- Produit selon les normes européennes les plus strictes
- Disponible dans toutes les pharmacies
- Prix très accessible - Excellent rapport qualité prix


EFFICACITÉ

À travers les études cliniques, **CO-ARINATE®** démontre une efficacité (guérison clinique et parasitologique) d'en moyenne 99%.

La sulfaméthoxypirazyne comparé à la sulfadoxine présente une plus grande fiabilité grâce à la plus faible variabilité de sa demi-vie d'élimination (65 à 80h vs. 40 à 400h) réduction nette du risque de résistance (plus adaptée à l'association avec pyriméthamine)

La liaison aux protéines: Une dose de 90 mg de sulfaméthoxypirazyne est suffisante pour atteindre un effet inhibiteur similaire à une dose de 1,5 g de sulfadoxine.

Co-Arinate vs comprimés de artéméther/luméfantrine



Sagara I et al. Am J Trop Med Hyg. 2006; 75(4): 630-6

Comparé au cpr d'artemether luméfantrine

- **Moins de comprimés à prendre - meilleure adhérence au traitement**
- **Plus de patients guérissent** ($p < 0,0001$)
- **Disparition plus rapide de la fièvre** ($p < 0,001$)
- **Moins de patients** (1,3% vs 9,4%) **rechutent** après 28 jours ($p < 0,01$)
- **Moins de patients souffrent d'anémie** après 28 jours (6,5% vs 13,8%)
- **Excellente tolérance cardiaque** (comparé au risques liés à la luméfantrine chez l'adulte)
- **Grossesse: utilisé à partir du 2^{ème} trimestre de la grossesse**



Pour le RCP complet, veuillez scanner ce code QR.

SCANNEZ