

Fluomizin®

chlorure de déqualinium

Traitement des infections vaginales d'origine bactérienne,
mycosique et/ou parasitaire

Réalisation d'asepsie avant les opérations gynécologiques
et les accouchements

POSOLOGIE

**Un comprimé vaginal à introduire profondément dans le vagin
le soir au coucher pendant 6 jours.**

**Amélioration nette de l'inflammation / des démangeaisons /
des écoulements et des odeurs dans les 24 à 72 heures.**

Il est important de terminer le traitement de 6 jours.

Un traitement plus court peut entraîner des récurrences.

AVANTAGES ET POINTS CLÉS:

Large spectre, action spécifique

Efficacité à long terme

Pas de résistances connues

Administration locale, bonne tolérance

FLUOMIZIN® peut être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement.

**FLUOMIZIN® est repris dans les recommandations internationales
du traitement de la vaginose bactérienne¹.**

¹Int J STD AIDS. 2018 Nov;29(13):1258-1272.

*Le traitement de la trichomoniose avec FLUOMIZIN® doit être accompagné
par un traitement adéquat par voie orale. Le(s) partenaire(s) de la dame affectée doit
(doivent) aussi recevoir un traitement.



SCANNEZ

Pour le RCP complet, veuillez consulter
www.dafrapharma.com
et créer votre compte personnel sur le site.

Fluomizin®

chlorure de déqualinium



INFECTION VAGINALE ?

Vaginose Bactérienne (VB) - Candidose Vulvo Vaginale (CVV)

Infections Mixtes (IM) - Infection parasitaire (trichomoniose*)

Fluomizin®

Action microbicide

contre tous les germes responsables des infections vaginales

(Antibactérienne – Antimycosique – Antiparasitaire)

Action Antiseptique avant les opérations gynécologiques et les accouchements.




Disponible uniquement en pharmacie



La Référence de l'Excellence

www.dafrapharma.com



Fluomizin®

chlorure de déqualinium



Multiple mode d'action microbicide




Excellent spectre d'activité

PATHOGENE		PRODUIT / SUBSTANCE	Fluomizin®	Clindamycine	Métronidazole	Clotrimazole	Fluconazole
BACTERIES	ANAEROBES	<i>Gardnerella vaginalis</i> Bacteroides, Prevotella	●	●	●	●	●
		<i>Atopobium vaginae</i>	●	●	●	●	●
	AEROBES	Gram-positif <i>Staphylococcus aureus</i> Streptococci, Enterococci	●	●	●	●	●
		Gram-négatif <i>Escherichia coli</i> <i>Klebsiella</i>	●	●	●	●	●
LEVURES	<i>Candida albicans</i>	●	●	●	●	●	
	<i>Candida glabrata</i> <i>Candida krusei</i>	●	●	●	●	●	
APPROUVE DANS TOUTES LES PHASES DE LA GROSSESSE			OK	précaution	Contre-Indiqué 1 ^{er} trimestre	précaution	précaution

● sensible ● Partiellement sensible ● résistant

Efficacité prouvée contre le biofilm bactérien dans la vaginose bactérienne

biofilm bactérien : un réseau cellulaire produit par des bactéries permettant aux pathogènes d'être moins sensibles à de diverses thérapies



Fluomizin®

- Large spectre, action spécifique
 - Grâce aux multiples modes d'action, le développement de résistances est peu probable.
- Administration locale, bonne tolérance
- **Possibilité d'utilisation pendant la grossesse et l'allaitement**

Pour le RCP complet, veuillez scanner ce code QR.



SCANNEZ