

## POUR UN SOULAGEMENT EFFICACE ET DURABLE

### Comment prendre Flurifen® ? (à partir de 12 ans)

#### **DOULEURS (INFLAMMATOIRES)**

La dose journalière recommandée est de 100 à 200 mg en 2 prises.  
En fonction de la sévérité des symptômes, la dose journalière totale peut être augmentée jusqu'à une dose de 300 mg en 3 prises.

#### **DOULEURS MENSTRUELLES**

- **Le soir avant le début des règles (au début des symptômes): 1 cp de 100 mg**
  - **J1** (où les symptômes sont sévères): 1 cp toutes les 4 à 6 heures (max 3)
  - **J2** : souvent 1 cp le matin est suffisant
- (une boîte de 15 cp suffit normalement pour couvrir 3 cycles)

### **FLURIFEN® antidouleur et anti-inflammatoire**

activité rapide (l'action analgésique commence au bout de 15 minutes)  
activité puissante  
diminue nettement les inflammations  
combat la douleur

Bien toléré aux doses thérapeutiques

En cas d'une utilisation prolongée, la prise concomitante d'un IPP peut être recommandé.

## QUALITÉ EUROPÉENNE - PRIX ABORDABLE



SCANNEZ

Pour les infos sur nos autres produits, veuillez consulter  
[www.dafrapharma.com](http://www.dafrapharma.com) et créer votre compte personnel sur le site.

# FLURIFEN®

flurbiprofène



Quand la **douleur** et/ou **l'inflammation**  
vous **handicape**



Boîte de 15 comprimés


**antidouleur et anti-inflammatoire**

*à action puissante et rapide*

Traitement de premier choix à partir de 12 ans



DOULEURS MENSTRUELLES  
RÈGLES DOULOUREUSES  
CRAMPES UTERINES



DOULEURS  
RHUMATISMALES



DOULEURS AU DOS



ENTORSES ET FOULURES



MAUX DE DENTS  
EXTRACTION  
CHIRURGIE DENTAIRE



**La Référence de l'Excellence**

[www.dafrapharma.com](http://www.dafrapharma.com)

# FLURIFEN®

flurbiprofène

## Quand la douleur et/ou l'inflammation vous handicape

### FLURIFEN®

EFFICACITÉ PROUVÉE

DANS LE TRAITEMENT DE LA DOULEUR ET DE L'INFLAMMATION <sup>(1-2-3)</sup>

- douleurs rhumatismales
- pathologies inflammatoires chroniques (polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite ankylosante, bursites et tendinites)
- chirurgie, traumatismes, lésions des tissus mous
- pathologie dentaire et chirurgie dentaire
- maladies et interventions gynécologiques
- calculs de l'appareil urogénital
- troubles neurologiques (céphalées - névralgies céphaliques - migraine)
- dysménorrhée

## QUALITÉ EUROPÉENNE - PRIX ABORDABLE

1, Single dose oral flurbiprofen for acute postoperative pain in adults (Review) Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 3, Art. No.: CD007358.

2, The analgesic efficacy of flurbiprofen compared to acetaminophen with codeine Cooper SA, Kupperman A 1991, J Clin Dent., 2(3):70-4.

3, LP 200 mg flurbiprofen versus LP 200 mg ketoprofen in rheumatoid arthritis in rheumatologic practice] Vignon E ea 1993-07, Rev Rhum Ed Fr., 60(7-8):530-5.



Pour le RCP complet, veuillez scanner ce code QR.

SCANNEZ


## Flurifen®: l'AINS puissant et bien toléré (à partir de 12 ans)

<b>EFFICACITÉ RAPIDE</b>	L'effet commence après 15 min. et devient maximal après 1h
<b>EFFICACITÉ PROLONGÉE</b>	L'effet continue pour au moins 6 heures
<b>EFFICACITÉ ANTI-INFLAMMATOIRE</b>	Réduction significative des médiateurs inflammatoires
<b>ACTION SPÉCIFIQUE SUR LES MUSCLES LISSES INFLAMMÉS</b>	Excellente activité dans la dysménorrhée
<b>BIEN TOLÉRÉ</b>	Moins d'effets secondaires comparé à d'autres AINS couramment utilisés*  <i>(piroxicam-naproxen-ketoprofen...) Feng &amp; Wang Molecular Pain Volume 14: 1-14</i>

### AVOIR SES RÈGLES C'EST NATUREL, EN SOUFFRIR NE L'EST PAS FLURIFEN® (200 à 300 mg/jour): le choix préféré de plus de 9 patients sur 10

- plus efficace que plusieurs autres analgésiques
- permet aux patients de continuer leurs activités journalières (moins d'absentéisme)
- permet de réduire le nombre de prises d'analgésiques
- diminue considérablement l'incidence de symptômes secondaires (nausées - faiblesse - perte de sang)
- diminue de façon significative l'activité utérine
- réduit la quantité de sang perdu dans la ménorragie jusqu'à 25%

EFFICACITÉ (douleurs) dans la dysménorrhée  
comparaison des molécules couramment disponibles



Clin Pharmacol Ther. 1982 Jul;32(1):76-80. - Am J Med. 1986 Mar 24;80(3A):71-5. - Acta obstetrica et gynecologica Scandinavica 1989)

\*Adapté de Feng & Wang Molecular Pain Volume 14:1-14