

HACTOSEC®

lévodropropizine

TRAITEMENT DE LA TOUX SÈCHE INCOMMODANTE

MODE D'ACTION UNIQUE

EXCELLENTE EFFICACITÉ ET TOLÉRABILITÉ

ADULTES	
10 ml (60 mg) de sirop, 3 fois par jour, à intervalles de minimum 6 heures.	
ENFANTS	
Patients pesant de 10 à 20 kg	2 ou 3 ml, 3 fois par jour
Patients pesant de 20 à 30 kg	5 ml, 3 fois par jour
Patients pesant plus de 30 kg	10 ml, 3 fois par jour

ACTION PÉRIFÉRIQUE TRACHÉOBRONCHIQUE UNIQUE

ABSENCE D'EFFET DÉPRIMANT CENTRAL

EFFICACITÉ SUPÉRIEURE AUX ANTITUSSIFS À ACTION CENTRAL

“HACTOSEC® (lévodropropizine) est un antitussif efficace chez si bien des enfants aussi bien que des adultes, avec des résultats significativement supérieurs dans la réduction de l'intensité de la toux, de la fréquence et des réveils nocturnes par rapport à d'autres antitussifs à action centrale.”

Zanasi et al. Multidisciplinary Respiratory Medicine (2015). 10:19.



SCANNEZ



Pour les infos sur nos autres produits, veuillez consulter www.dafrapharma.com et créer votre compte personnel sur le site.

HACTOSEC®


lévodropropizine



TRAITEMENT DE LA TOUX SÈCHE INCOMMODANTE
AVEC UN MODE D'ACTION UNIQUE



EXCELLENTE
EFFICACITÉ &
TOLÉRABILITÉ



La Référence de l'Excellence
www.dafrapharma.com


HACTOSEC®

lévodropropizine



HACTOSEC®

- Flacon 150 ml
- levodropropizine 30 mg/5 ml
- arôme agréable cacao-crème
- cuillère doseuse



Une nouvelle approche inégalée dans le traitement de la toux sèche

L'ANTITUSSIF LE PLUS EFFICACE*

avec un mode d'action unique

- À partir de 2 ans
- Traitement de choix de la toux sèche
- **Pas d'inhibition centrale**
- La meilleure efficacité (intensité et de fréquence de la toux)
- Moins de réveils nocturnes


*Levodropropizine for treating cough in adult and children: a meta-analysis of published studies
(Zanasi et al. Multidisciplinary Respiratory Medicine (2015) 10:19)

Pour le RCP complet, veuillez scanner ce code QR.



SCANNEZ

Reflexe de la toux



HACTOSEC® (lévodropropazine)

Éviter que le reflexe de la toux se déclenche

- action périphérique sur les neuropeptides sensoriels au niveau trachéobronchique
- absence d'effet déprimant central
- inhiber la toux sèche sans effet anticholinergique ou sédatif
- durée de l'action: > 6 heures sur les toux induites chimiquement

pas de dépression respiratoire - pas de somnolence/sedation
pas d'impact sur la vigilance
pas de constipation - pas de rétention urinaire
pas de suppression de la mobilité ciliaire

HACTOSEC® contient 0,50 g de saccharose/ml – attention chez les diabétiques

HACTOSEC® ne doit pas être donné

- aux enfants de moins de 2 ans
- au cours de la grossesse et de l'allaitement

HACTOSEC® ne doit pas être combiné avec un médicament ayant une activité mucolytique ou expectorante

En vu de l'utilisation possible chez l'enfant en dessous de 6 ans, HACTOSEC® se vend uniquement sur ordonnance.