

Momex[®]

furoate de mométasone

TRAITEMENT PUISSANT DES SYMPTÔMES NASAUX D'ALLERGIES

POSOLOGIE

Pour les enfants âgés de 3 à 11 ans	Une pulvérisation dans chaque narine une fois par jour.
Adolescents > 12	Deux pulvérisations dans chaque narine une fois par jour.
Adultes	Deux pulvérisations dans chaque narine une fois par jour.

Le seul spray mométhasone avec **140** pulvérisations

Arrêtez les symptômes d'allergie

Gonflement et irritation du nez, les éternuements,
les démangeaisons ainsi que l'obstruction ou les écoulements nasaux.



SCANNEZ

Pour les infos sur nos autres produits,
veuillez consulter www.dafrapharma.com
et créer votre compte personnel sur le site.

Momex[®]

furoate de mométasone



TRAITEMENT PUISSANT DES SYMPTÔMES NASAUX D'ALLERGIES



STOP allergies

- RHINITE ALLERGIQUE SAISONNIÈRE (RHUME DES FOINS)
- RHINITE PÉRANNUELLE (DE LONGUE DURÉE)
- POLYPES NASAUX



La Référence de l'Excellence

www.dafrapharma.com

Momex®

furoate de mométasone



- Le seul spray nasal de mométhasone avec **140 pulvérisations**

Momex® couvre au moins 10 jours de plus comparé aux autres corticoïdes par voie nasale

- Momex® : le meilleur score thérapeutique*
- excellente efficacité

Paramètres d'efficacité	<ul style="list-style-type: none">» Symptômes nasaux de la rhinite allergique» Symptômes oculaires de la rhinite allergique (conjonctivite...)» Évaluation globale du patient (ou du médecin) de l'efficacité
Paramètres de tolérance	<ul style="list-style-type: none">» Sécurité (effets secondaires)<ul style="list-style-type: none">• Epistaxis (saignements du nez)• Effets secondaires à long terme• Effets secondaires oculaires (glaucome ...)• Effets systémiques

Momex® : le corticoïde nasal le plus sûr


-> pas absorbé au niveau systématique

Therapeutic Index (TIX) for intranasal corticosteroids in the treatment of allergic rhinitis T.Schäfer et al., Rhinology 49:272-280, 2011*

Pour le RCP complet, veuillez scanner ce code QR.




Index thérapeutique (TIX)*: Comparaison efficacité/tolérance des corticoïdes intranasaux dans le traitement de la rhinite allergique



Instructions pour une utilisation correcte:

1. Agitez délicatement le flacon avant chaque utilisation.
2. Retirez le bouchon en plastique (fig.1). Si vous utilisez votre médicament pour la première fois, appuyez le fond du flacon sur votre pouce. Placez votre index et votre majeur sur l'applicateur blanc et ulvérisez le médicament en enfonçant l'applicateur. Répétez cette procédure en actionnant le pulvérisateur jusqu'à la production d'une fine brume (fig.2).
3. Mouchez-vous délicatement pour vous déboucher les narines ou expirez par le nez.
4. Fermez une narine et placez l'extrémité de l'applicateur dans l'autre narine (fig.3).
5. Penchez la tête légèrement en avant, et maintenant le flacon à la verticale. Commencez à inspirer lentement par le nez et, pendant l'inspiration, pulvérisez le médicament dans votre nez en exerçant une pression sur l'applicateur blanc avec les doigts.
6. Après la procédure, retirez l'applicateur de la narine traitée et expirez par la bouche.
7. Répétez la même procédure pour l'autre narine.
8. Essayez soigneusement l'applicateur nasal à l'aide d'un mouchoir en tissu ou en papier propre et replacez le bouchon en plastique.



1



2



3



4