

Rhino PAROL[®]

paracétamol, chlorphéniramine
& phényléphrine

**DÉBARRASSEZ-VOUS D'UN NEZ BOUCHÉ OU COULANT
METTEZ FIN AUX CONGESTIONS ET ÉTERNUEMENTS
NE SOUFFREZ PLUS DES DOULEURS ET DE LA FIÈVRE**



DOSE HABITUELLE: À PARTIR DE 12 ANS

AU BESOIN: 1 COMPRIMÉ PAR INTERVALLE DE 6 HEURES

MAX 4 COMPRIMÉS/JOUR

CORYZA – GRIPPE – RHUME – RHINITE – PHARYNGITE –
SINUSITE – BRONCHITE – LARYNGITE – ALLERGIES



SCANNEZ

Pour les infos sur nos autres
produits, veuillez consulter
www.dafrapharma.com
et créer votre compte
personnel sur le site.

Rhino PAROL®

paracétamol, chlorphéniramine
& phényléphrine



MULTI-ACTION CONTRE LES SYMPTÔMES DU RHUME ET DES ALLERGIES:

À PARTIR DE 12 ANS

- Nez bouché
- Nez coulant
- Congestion des sinus
- Éternuements
- Douleur
- Fièvre



La Référence de l'Excellence

www.dafrapharma.com

Rhino PAROL®

paracétamol, chlorphéniramine
& phényléphrine



SUBSTANCES ACTIVES HAUTEMENT CONCENTRÉES POUR UN SOULAGEMENT RAPIDE ET EFFICACE

Paracétamol	650 mg	DOULEURS FIÈVRE
Chlorphéniramine	4 mg	ÉTERNUEMENTS NEZ COULANT DÉMANGEAISONS YEUX LARMOYANTS
Phényléphrine	10 mg	DÉCONGESTIONNANT NEZ BOUCHÉ

Excellente efficacité

Début de l'effet : après quelques minutes

Durée de l'effet : en moyenne 4 à 6 heures

L'utilisation de RHINOPAROL® n'est pas recommandée pendant la grossesse chez les mères allaitantes.

Chez certains patients qui reçoivent du chlorphéniramine, des effets secondaires tels que la somnolence, des vertiges, une vision floue, des tremblements et de l'excitabilité peuvent se produire. Les patients doivent être avertis de ne pas s'engager dans des activités dangereuses lorsqu'ils souffrent de ces effets secondaires.

CORYZA

GRIPPE

RHINITE

RHUME

PHARYNGITE

SINUSITE

BRONCHITE

LARYNGITE



ALLERGIES

RHINOSINUSITE

DÉBARRASSEZ-VOUS D'UN NEZ BOUCHÉ OU COULANT

METTEZ FIN AUX CONGESTIONS ET ÉTERNUEMENTS

NE SOUFFREZ PLUS DES DOULEURS ET DE LA FIÈVRE

CONTRE-INDICATIONS: RHINOPAROL® est contre-indiqué chez les patients ayant des antécédents d'hypersensibilité à l'un de ses ingrédients actifs ou inactifs. Il est également contre-indiqué dans les cas d'hyperplasie bénigne de la prostate, d'obstruction du cou de la vessie, de glaucome à angle fermé, d'asthme aigu, d'hyperthyroïde, d'hypertension artérielle sévère, d'arythmies.

EFFETS INDÉSIRABLES: La somnolence, les palpitations, la vision floue, la bouche sèche, l'anorexie, l'irritabilité, la difficulté à uriner, les allergies de la peau, la transpiration, les acouphènes, la tachycardie, la photosensibilité, la sensation de brûlure d'estomac.

Pour le RCP complet, veuillez scanner ce code QR.



SCANNEZ