

Arinate®

*Face au paludisme sévère, un traitement antipaludique
par voie parentérale s'impose sans délai...*

Recommandé dans le traitement du paludisme sévère

AVANTAGES ARINATE®

- Thérapie recommandée
 - Facile à administrer
- Disponible en 60 - 120 et 240 mg
- Meilleure efficacité (réduction de mortalité)
 - Clairance parasitaire rapide
 - Sortie rapide du coma
- Réduction de la durée de l'hospitalisation
- Excellente tolérance aux dosages recommandés
 - Qualité DAFRA
 - Prix abordable



SCANNEZ



Pour les infos sur nos autres produits,
veuillez consulter www.dafrapharma.com
et créer votre compte personnel sur le site.

TRAITEMENT D'URGENCE DU PALUDISME SÉVÈRE

Arinate®[®] IV/IM

artésunate



SCANNEZ

Pour le RCP complet,
veuillez scanner ce code QR.

Traitement recommandé par l'OMS

Arinate® peut être administré en IM ou en IV

Après le traitement injectable de la phase critique
il est nécessaire de faire le relais vers un traitement oral complet
d'une Combinaison Thérapeutique à base d'Artémisinine (CTA) efficace.
Co-Arinate® / Co-Artesiane®

*Dans certains pays il n'y a que quelques formes qui sont disponibles

Arinate®

artésunate

TRAITEMENT CURATIF DU PALUDISME SÉVÈRE

POSOLOGIE PONDÉRALE

Enfant de moins de 20 kg	Enfants à partir de 20 kg et adultes
3 mg/kg par dose	2,4 mg/kg par dose
- Jour 1: 3 doses (0h - 12h - 24h) - Jour 2 à 5: 1 dose par 24h	

A: PESER LE PATIENT

B: DÉTERMINER LE NOMBRE DE FLACONS PAR DOSE (en fonction du poids)

	< 25 kg	26 - 50 kg	51 - 75 kg	> 75 kg
Nombre de flacons de 60 mg	1	2	3	4
Nombre de flacons de 120 mg	1	1	2	2
Nombre de flacons de 240 mg	1	1	1	1

C : RECONSTITUER LA SOLUTION INJECTABLE (pour activer **Arinate®**)

Injectez le contenu complet de l'ampoule de bicarbonate de sodium dans le flacon contenant la poudre d'artésunate pour préparer une solution homogène et limpide à injecter.
La solution reconstituée doit être utilisée dans l'heure qui suit sa préparation.

D : DILUER LA SOLUTION D'Arinate® RECONSTITUÉE

avec l'ampoule fournie de sérum physiologique à 0.9%
la quantité de diluant à utiliser dépend de la voie d'administration envisagée

	Administration IV		Administration IM	
	Concentration à obtenir: 10 mg/ml		Concentration à obtenir: 20 mg/ml	
	Quantité de diluant à rajouter	Volume total obtenu	Quantité de diluant à rajouter	Volume total obtenu
60 mg	Rajouter 5 ml de diluant	6 ml	Rajouter 2 ml de diluant	3 ml
120 mg	Rajouter 10 ml de diluant	12 ml	Rajouter 4 ml de diluant	6 ml
240 mg	Rajouter 20 ml de diluant	24 ml	Rajouter 8 ml de diluant	12 ml

E : INJECTER LE VOLUME D'Arinate® À ADMINISTRER (par dose)

(la quantité est en fonction du poids du patient et de la voie d'administration)

Kg	IV	IM	Kg	IV	IM
< 6	1	1	51-54	13	7
6-7	2		55-58	14	
8-10	3	2	59-62	15	8
11-13	4		63-66	16	
14-16	5	3	67-70	17	9
17-25	6		71-75	18	
26-29	7	4	76-79	19	10
30-33	8		80-83	20	
34-37	9	5	84-87	21	11
38-41	10		88-91	22	
42-45	11	6	92-95	23	12
46-50	12		96-100	24	

Voie IV: injecter en bolus lent (3 à 4 ml par minute)

Voie IM: Injecter lentement et répartir sur des zones différentes pour des doses supérieures à 2 ml chez l'enfant, ou supérieur à 5 ml chez l'adulte.

Les quantités non-données doivent être jetées