

Amlovie®

amlodipine

POSOLOGIE

La posologie initiale recommandée est de 5 mg une fois par jour.

Cette dose peut être augmentée jusqu'à 10 mg une fois par jour.

Ajustez le dosage en fonction des objectifs de pression artérielle. En général, attendez 7 à 14 jours entre les étapes de titrage. Cependant, si la situation clinique le justifie, il est possible de titrer plus rapidement, à condition que le patient soit évalué fréquemment.

Il est préférable de prendre **AMLOVIE®** tous les jours à la même heure avec un verre d'eau.

L'abaissement de la pression artérielle réduit le risque d'événements cardiovasculaires mortels et non mortels, principalement les accidents vasculaires cérébraux et les infarctus du myocarde.

Tenez vos patients à coeur

Relaxez les vaisseaux...

... pour diminuer la pression artérielle

... pour améliorer l'apport sanguin au muscle cardiaque

DAFRA PHARMA INTERNATIONAL

Bureau Central – Slachthuisstraat 30/7 – 2300 Turnhout – La Belgique



La Référence de l'Excellence

www.dafrapharma.com

Amlovie®


amlodipine



**Hypertension artérielle
Angine de poitrine**



L'antagoniste calcique de référence



Relaxez les vaisseaux...

... pour diminuer la pression
... pour améliorer l'apport sanguin au muscle cardiaque

Antagoniste calcique de haute qualité européenne
À UN PRIX TRÈS ACCESSIBLE



La Référence de l'Excellence

www.dafrapharma.com

Amlovie®

amlodipine

AMLOVIE® est utilisé pour traiter l'**hypertension** ou l'**angor** (angine de poitrine).

- Chez les patients présentant des valeurs élevées de la pression artérielle, **AMLOVIE®** agit en relaxant les vaisseaux sanguins, de telle sorte que le sang les traverse plus facilement.
- Chez les patients atteints d'angor, **AMLOVIE®** agit en améliorant l'apport sanguin au muscle cardiaque, qui reçoit ainsi plus d'oxygène, ce qui prévient l'apparition d'une douleur thoracique.

Comment prendre Amlovie® ?

- La posologie initiale recommandée est de 5 mg une fois par jour.
- Cette dose peut être augmentée jusqu'à 10 mg une fois par jour.
- Il est préférable de prendre **AMLOVIE®** tous les jours à la même heure avec un verre d'eau.

Populations particulières:

- Personnes âgées : **AMLOVIE®** montre une bonne tolérance équivalente chez les patients âgés et les patients plus jeunes. Des schémas posologiques normaux sont recommandés chez les personnes âgées, mais une augmentation de la posologie doit être effectuée avec précaution.
- Insuffisance hépatique : La dose doit donc être déterminée avec prudence et le traitement doit débiter avec une dose se situant à la limite inférieure de l'intervalle thérapeutique. Instaurer le traitement par **AMLOVIE®** à la dose la plus faible possible et réaliser une titration lente de la dose chez les patients ayant une insuffisance hépatique sévère.
- Insuffisance rénale : Une posologie usuelle est recommandée.
- Population pédiatrique : Enfants et adolescents hypertendus de 6 ans à 17 ans : la posologie antihypertensive orale recommandée chez les enfants âgés de 6 à 17 ans est de 2,5 mg une fois par jour comme dose initiale. Cette dose peut être augmentée jusqu'à 5 mg une fois par jour si la pression artérielle souhaitée n'est pas atteinte après 4 semaines. Des posologies supérieures à 5 mg une fois par jour n'ont pas été étudiées chez les patients pédiatriques. Une posologie d'amlodipine de 2,5 mg n'est pas possible avec **AMLOVIE®** 10 mg. Enfants de moins de 6 ans : Il n'y a pas de données disponibles.

Chez les patients hypertendus, **AMLOVIE®** peut être utilisé en association avec un diurétique thiazidique, un alphabloquant, un bêtabloquant ou un inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine.

Dans l'angor, **AMLOVIE®** peut être utilisé en monothérapie ou en association avec d'autres antiangineux chez les patients présentant un angor réfractaire aux dérivés nitrés et/ou à des doses adéquates de bêtabloquants.

Effets indésirables: Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés en cours de traitement sont: des somnolences, des sensations vertigineuses, des céphalées, des palpitations, des bouffées vasomotrices, des douleurs abdominales, des nausées, des œdèmes des chevilles, des œdèmes et de la fatigue.

Ne prenez pas **AMLOVIE®** en cas d'allergie à l'amlodipine ou aux autres inhibiteurs calciques ou à l'un des composants de ce médicament, d'une hypotension, de sténose de la valve aortique ou un choc cardiogénique et une insuffisance cardiaque après une crise cardiaque.

VASOCONSTRICTION



augmentation de la pression artérielle
L'HYPERTENSION ARTÉRIELLE :
un tueur silencieux

diminution du flux sanguin distale et
de l'oxygénation
L'ANGINE DE POITRINE :
un présage d'une crise cardiaque

Amlovie®



**AMLOVIE® combat
l'hypertension artérielle**

**AMLOVIE® soigne et/ou
prévient l'angine de poitrine**

Tenez vos patients à coeur

Relaxez les vaisseaux...

... pour diminuer la pression artérielle

... pour améliorer l'apport sanguin au muscle cardiaque

AMLOVIE® est un médicament délivré sur ordonnance.

Pour le RCP complet, consultez www.dafrapharma.com