

Dafraclav[®]

amoxicilline & acide clavulanique

Indications

Infections des voies respiratoires supérieures

- Otite moyenne / sinusite / amygdalite / pharyngite / laryngite

Infections des voies respiratoires inférieures

- Bronchite chronique (surinfection), pneumonie communautaire

Infections de la peau et des tissus mous

- Cellulite, morsures animales
- Abscess dentaire
- Abscess, furoncles, plaies, acnés surinfectés

Infections urinaires

- Cystite, pyélonéphrite

Infections osseuses et articulaires

SUSPENSIONS		COMPRIMÉS	
Nourrissons (5 à 12 kg) de 2 mois à 2 ans	Enfants (12 à 30 kg) de 2 à 6 ans	Enfants (30 à 40 kg) 6 à 12 ans	Adultes (> 40 kg)
Susp 200/28 mg 5 ml 40 mg d'amoxicilline par ml	Susp 400/57 mg 5 ml 80 mg d'amoxicilline par ml	Comp 625 mg (500/125)	Comp 625 mg (500/125)
25 mg/kg/jour à 70 mg/kg/jour divisés en deux prises (toutes les 12 heures) exemple 5 ml x 2/jour pendant 7 jours		1 comp 2 x jour (toutes les 12 heures)	1 comp 3 x jour (toutes les 8 heures)
			Comp 1 (875/125) 1 comp 2 x jour (toutes les 12 heures)
Les doses dépendent de la sévérité et la localisation de l'infection et de la sensibilité de l'isolat insuffisance rénale: adaptation posologique si le débit de filtration glomérulaire < 30 ml/min.			

DAFRA PHARMA INTERNATIONAL

Bureau Central
Slachthuisstraat 30/7,
2300 Turnhout
La Belgique

3FITCF 2021

Dafraclav®

amoxicilline & acide clavulanique

**L'alliance gagnante:
de l'amoxicilline, de l'acide clavulanique
et de la qualité de Dafra!**

DAFRACLAV® SUSPENSIONS DAFRACLAV® COMPRIMÉS



DAFRACLAV® 200/28 susp (2 mois - 2 ans)
DAFRACLAV® 400/57 susp Forte (2 - 6 ans)

DAFRACLAV® 625 mg B/15 cp
DAFRACLAV® 1000 mg B/10 cp

Infections bactériennes:
ORL, Broncho-pulmonaires,
Tissus Mous et Urinaires

Infections bactériennes:
ORL, Broncho-pulmonaires,
Tissus Mous,
Gynécologiques et Urinaires



La Référence de l'Excellence
www.dafrapharma.com

Dafraclav®

amoxicilline & acide clavulanique



PRESENTATIONS:

- **DAFRACLAV® 228 mg** (200mg/28 mg par cuillère doseuse de 5 ml) **poudre** pour 70 ml de suspension buvable
- **DAFRACLAV® 457 mg** (400 mg/57 mg par cuillère doseuse de 5 ml) **poudre** pour 70 ml de suspension buvable
- **DAFRACLAV® 625 mg** (500mg/125 mg) **comprimé**, boîte de 15
- **DAFRACLAV® 1000 mg comprimé** (875mg/125mg) boîte de 10

INDICATIONS

DAFRACLAV® est utilisé dans le traitement des infections dues à des bactéries Gram (+) et Gram (-), en particulier les germes qui synthétisent de la β -lactamase et sont de ce fait résistants à l'amoxicilline seule. Dosée correctement et pris pendant une période suffisante **DAFRACLAV®** est très utile dans le traitement des infections suivantes :

- Infections dans la sphère ORL : Angines - Amygdalite / Pharyngite / Laryngite; Otite moyenne; Sinusite
- Infections des voies respiratoires inférieures : Bronchite aiguë avec surinfection bactérienne;
- Exacerbations aiguës d'une bronchite chronique ;Pneumonie bactérienne
- Infections de la peau et des tissus mous : Cellulite; Morsures animales
- Abscès dentaire sévère avec propagation de cellulite
- Infections du tractus urinaire et du tractus génital (à l'exception de prostatite) : Cystite, urétrite Pyélonéphrite
- Infections gastro-intestinales: Fièvre typhoïde, paratyphoïde, shigellose
- Infections osseuses et articulaires, en particulier l'ostéomyélite.

POSOLOGIE recommandée:

Suspensions 200/28 et 400/57 par 5 ml : La dose habituelle est de 25 mg à 45 mg d'amoxicilline de poids corporel et par jour. La dose supérieure va jusqu'à 70 mg d'amoxicilline de poids corporel et par jour. La dose journalière doit être divisée en deux portions égales, administrée toutes les 12 heures. Utilisez la cuillère doseuse fournie pour donner la dose appropriée.

Comprimés 500/125 : un comprimé de **DAFRACLAV®** 625 toutes les 8 heures (adultes) / un comprimé toutes les 12 h (grands enfants 30 à 40 kg)

Comprimés 875/125 : Un comprimé de **DAFRACLAV®** 1000 mg toutes les 12 heures . Si besoin augmenter à 1 comprimé toutes les 8h.

Une adaptation posologique est nécessaire chez les patients ayant une clairance rénale < 30 ml/min

Grossesse, allaitement : comme pour chaque médicament l'utilisation doit être évitée pendant la grossesse et l'allaitement à moins que le médecin ne la considère comme indispensable.

DAFRACLAV® n'est pas contre-indiqué pour ces patients.

CONTRE-INDICATIONS : **DAFRACLAV®** est contre-indiqué chez les patients qui ont des antécédents d'allergie à la pénicilline. Il est également contre-indiqué chez les patients qui ont des antécédents de jaunisse cholestatique ou de dysfonctionnement hépatique résultant de l'utilisation de l'amoxicilline/acide clavulanique.

Effets indésirables : comme pour la majorité des antibiotiques les effets indésirables médicamenteux les plus fréquemment rapportés sont de la diarrhée, des nausées et des vomissements.

DAFRACLAV® est unique :

C'est l'association de l'amoxicilline avec l'acide clavulanique de Dafra Pharma avec des concentrations de substances actives « uniques » sur le marché.

Concernant les ratios entre amoxicilline et acide clavulanique – consensus International

- **Les rapports 7/1 et 8/1 sont plus appropriés que le rapport 4:1 dans le traitement de certaines infections plus sévères.**
- **Pour le rapport 7/1 la dose standard est à deux prises par jour (toutes les 12h)**, sauf pour les infections les plus sévères où trois prises par jour sont recommandées.
- **Pour le rapport 8/1 la dose standard est à trois prises par jour (toutes les 8h)**, sauf pour les infections légères où deux prises peuvent être utilisées.

Les avantages de DAFRACLAV®

- antibiotique bactéricide à spectre d'activité large / Un choix raisonnable même avant des cultures et des tests de sensibilité
- Formes adaptées aux patients - Les emballages sont conçus pour offrir un usage adéquat
 - **Enfants**
 - jusqu'à 2 ans (12 kg) : Suspension 228 mg
 - de 2 à 6 ans : Suspension 457 mg
 - de 6 à 12 ans : comprimés 625 mg : 2 comp/jour
 - Les emballages permettent 7 jours de traitement
 - **Adultes**
 - Comprimés 625mg (500/125) : 3 comprimés/jour
 - Comprimés 1g (875/125) 2 comprimés/jour
- **Suspensions** :
 - Poudre très fine -> suspension homogène
 - Flacon foncé : protection contre la luminosité
 - Bouchon brevetté : l'humidité ne peut pas entrer
 - Production en Europe , excellente qualité
- **Comprimés**
 - Blisters alu-alu : protection optimale contre la lumière et l'humidité
 - 1 comp par prise
 - Production en Europe, excellente qualité

DAFRACLAV®: L'alliance gagnante. La synergie qui apporte l'efficacité

Pour le RCP complet, veuillez consulter www.dafrapharma.com