SEKROL®

Sekrol® sirop pédiatrique
15 mg / 5ml - Flacon de 100 ml

Sekrol® sirop adulte
30 mg / 5ml - Flacon de 150 ml

SEKROL® INDICATIONS

Le traitement symptomatique des maladies aiguës et/ou chroniques des voies respiratoires dans lesquelles la viscosité du mucus est augmentée, les sécrétions sont augmentées et la clairance mucociliaire est affaiblie.

(États d'encombrement des voies respiratoires en rapport avec une stagnation des sécrétions au niveau de l'arbre trachéo-bronchique, survenant au cours de la bronchite chronique)

SEKROL®
15 mg / 5 ml - Sirop, flacon de 100 ml

AGE	QUANTITÉ À ADMINISTRER
< 2 ans	1 à 2,5 ml (1/2 mesure), 2 fois par jour
2 - 5 ans	2,5 à 5 ml (1/2 à 1 mesure), 3 fois par jour
5 - 12 ans	5 à 10 ml (1 à 2 mesure), 2 fois par jour
à partir de 12 ans	10 à 20 ml, 3 fois par jour pendant les 2 à 3 premiers jours du traitement. 10 ml, 2 à 3 fois par jour en traitement d'entretien.

SEKROL®
30 mg / 5 ml - Sirop, flacon de 150 ml

5 à 10 ml, 3 fois par jour pendant les 2 à 3 premiers jours du traitement.

5 ml, 2 à 3 fois par jour en traitement d'entretien.

Il n'est pas nécessaire de réduire ou d'ajuster la posologie pour les patients âgés.

Pour les enfants de moins de 2 ans, le médecin traitant décide d'utiliser SEKROL® 15mg/5ml individuellement.
En abscence d'avis médical, donner le médicament à un enfant en dessous de 2 ans est déconseillé.

3FISEKF 2021

Dafra PHARMA

DAFRA PHARMA INTERNATIONAL

Bureau Central
Slachthuisstraat 30/7
2300 Turnhout – La Belgique

SEKROL®

ambroxol

GMP EUROPÉEN

TOUX GRASSE, BRONCHITE, TOUX ASTHMATIFORME, BRONCHECTASIE

Respirer librement et profondément.
La meilleure arme contre les toux grasses

pour enfants et adultes

SEKROL®:

Fluidifiant

Expectorant

Le seul de sa classe indiqué chez des enfants en dessous de 2 ans

Dafra PHARMA

La Référence de l'Excellence

www.dafrapharma.com

SEKROL®

Le traitement symptomatique de premier choix des maladies des voies respiratoires dans lesquelles on a une stagnation ou une pertubation des sécrétions du mucus.

- la viscosité du mucus est augmentée
- les sécrétions sont augmentées
- la clairance mucociliaire est affaiblie

SEKROL® est ou a une action	**IMPLICATION CLINIQUE**
SÉCRÉTOLYTIQUE	Stimulation des cellules épithéliales sérieuses qui sécrètent un mucus très liquide. **Le mucus devient plus facile à expectorer.**
SÉCRÉTOMOTRICE	Augmente la fréquence de l'activité des structures ciliaires. **Le mucus est évacué d'une façon active.**
FAVORISE LA PRODUCTION DE SURFACTANT	Le surfactant est indispensable à une fonction respiratoire normale. La réduction de la tension superficielle facilite l'expansion des alvéoles à l'inspiration et les maintient ouvertures pendant l'expiration. Le surfactant aide aussi le mucus à être déplacé plus facilement. **Le mucus est évacué plus facilement. Les échanges gaseuses dans les poumons s'améliorent.**
AUGMENTATION DES GAMMAGLOBULINES	Les gammaglobulines interviennent dans le système immunitaire. **SEKROL® favorise une action anti-inflammatoire indirecte dans les muqueuses tranchéobronchiques.**
ACTION ANTI-OXYDANTE (propriétés anti-radicaux libres)	**Agit contre les radicaux libres à travers la réduction de l'oxydation cellulaire nocive pour le tissu pulmonaire.**

- SEKROL® est totalement résorbé apres une prise orale. La biodisponibilité absolue est d'environ 80 %.
- Concentration plasmatique maximale après environ 2h. La demi-vie d'élimination moyenne est d'environ 9 à 10 heures. Les taux plasmatiques lors de prises thérapeutiques répétées ne montrent pas d'accumulation.
- L' excrétion se fait essentiellement par voie rénale sous forme de métabolites inactives. Moins de 10 % sont éliminés sous forme inchangée.

SEKROL® permet aux enfants et adultes de respirer librement et profondément.

Mise en garde: L' association d'un mucolytique avec un antitussif est irrationnelle.

Contre-indications
SEKROL® est contre-indiqué chez les patients qui sont hypersensibles à la substance active ou à l'un des excipients; Les patients atteints d'une intolérance au fructose ne doivent pas recevoir ce médicament. En présence d'une insuffisance rénale ou d'une hépatopathie sévère, SEKROL® ne sera administré qu'après avoir consulté un médecin.

Grossesse
L'ambroxol traverse la barrière placentaire. Les études n'indiquent pas d'effets néfastes sur la grossesse, le développement embryonnaire ou fœtal, l'accouchement ou le développement postnatal. Une large expérience clinique avec l' ambroxol après la 28ème semaine de grossesse n'a pas révélé d'effets délétères pour le fœtus. Néanmoins, les précautions habituelles en ce qui concerne l'usage de médicaments pendant la grossesse doivent être observées. En particulier pendant le premier trimestre, l'emploi de SEKROL® n'est pas recommandé.

Allaitement
L'ambroxol est excrété dans le lait maternel. Bien qu'aucun effet indésirable ne soit attendu auprès des nourrissons allaités, l'administration de SEKROL® est déconseillée au cours de la période de lactation.

Effets indésirables
Les réactions indésirables les plus fréquemment rapportées sont les effets liés au système gastro-intestinal, tels que nausée, vomissement, hypoesthésie et diarrhée. Des démangeaisons et des éruptions cutanées sont rapportées plus rarement. Des réactions allergiques peuvent apparaître de manière sporadique.

- **SEKROL®** est le meilleur produit disponible contre la toux productive et les états d'encombrement des voies respiratoires.
- **SEKROL®** s'attaque rapidement à l'irritation dans les voies pulmonaires et diminue la viscosité du mucus dans les poumons.
- **SEKROL®** est très bien toléré. Le patient prendra son médicament.
- **SEKROL®** diminue rapidement les maux et les rougeurs de gorge, souvent associés a une toux productive.(effet de contact)
- **SEKROL®** permet aux enfants et aux adultes de respirer librement et profondément.
- **SEKROL®** n'interagit pas avec d'autres médicaments et est utilisable avec tous les antibiotiques (même une synergie a été démontrée).
- **SEKROL®** convient pour des patients diabétiques.
- **SEKROL®** est produit selon les standards les plus strictes (GMP européen).

Pour le RCP complet, veuillez consulter www.dafrapharma.com