

Datramol®

tramadol/paracétamol

Action complémentaire du paracétamol et du tramadol, 2 antidouleurs qui agissent à travers des voies différentes pour une excellente maîtrise de la douleur modérée à sévère.

- Le paracétamol agit après 15 à 30 minutes en inhibant au niveau central la production de prostaglandines, impliquées dans les processus de la douleur et de la fièvre.
- Le tramadol exerce son action en se liant aux récepteurs opiacés situés au niveau des sites impliqués dans le contrôle de la douleur et fonctionne de 5 à 7 heures.

La combinaison fonctionne mieux par rapport aux composants individuels, offrant un début d'action plus rapide et une durée d'action plus longue.

DATRAMOL®

- Un excellent rapport bénéfice/risque grâce à l'amélioration de l'analgésie (synergie ou addition) et/ou la réduction des effets secondaires.
- Pas d'interaction indésirable lorsque les deux analgésiques sont administrés en combinaison.

POSOLOGIE

La dose doit être adaptée en fonction de l'intensité de la douleur et de la sensibilité de chaque patient. En général, la dose efficace la plus faible ayant un effet analgésique doit être sélectionnée.

- Dose initiale recommandée : 1 à 2 comprimés orodispersibles
- Des doses complémentaires peuvent être administrées en fonction des besoins, sans dépasser 8 comprimés orodispersibles (équivalant à 300 mg de tramadol et 2600 mg de paracétamol) par jour.
- L'intervalle entre les doses ne doit pas être inférieur à six heures.

Ne pas administrer plus longtemps qu'il n'est strictement nécessaire.

DAFRA PHARMA INTERNATIONAL

Bureau Central – Slachthuisstraat 30/7 – 2300 Turnhout – La Belgique



La Référence de l'Excellence

www.dafrapharma.com

Datramol®

tramadol/paracétamol



PAS DE TEMPS POUR LA DOULEUR

*Améliorez la qualité de vie
des patients handicapés par la douleur*

**TRAITEMENT SYMPTOMATIQUE DES DOULEURS MODÉRÉES À
SÉVÈRES CHEZ LES ADULTES ET ADOLESCENTS DE PLUS DE 12 ANS**



**La seule combinaison tramadol/paracétamol
avec des comprimés ORODISPERSIBLES**

Boîte de 10 comprimés orodispersibles

Arôme de menthe

ACTIVITÉ PUISSANTE ET RAPIDE

Pas besoin d'eau pour la prise



La Référence de l'Excellence

www.dafrapharma.com

Datramol®

tramadol/paracétamol

tramadol 37,5 mg /paracétamol 325 mg



DATRAMOL®

Efficacité prouvée dans divers types de douleur modérée à modérément intense

- Traumatologie – fractures – ...
- Douleurs postopératoires
- Lombalgies (sévères)
- Douleurs dentaires sévères

Le comprimé orodispersible doit être placé sur la langue et sucé, sans mâcher, jusqu'à ce qu'il se désintègre complètement. La suspension obtenue doit être avalée avec de la salive. Le comprimé peut être également pris avec ou sans liquide. Sinon, dissolvez le comprimé dans de l'eau et buvez la suspension obtenue.

CONTRE-INDICATIONS: hypersensibilité aux substances actives ou à l'un des excipients, intoxication aiguë par de l'alcool, des médicaments hypnotiques, des analgésiques centraux, des opioïdes ou des médicaments psychotropes, traitement concomitant avec des IMAO ou dans les 2 semaines suivant l'arrêt du traitement, insuffisance hépatique sévère et épilepsie non contrôlée par un traitement.


MISES EN GARDE:

- **La dose maximale de 8 comprimés orodispersibles par jour ne doit pas être dépassée.**
- Ne pas utiliser simultanément d'autres médicaments contenant du paracétamol ou du tramadol
- En cas d'insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine < 10 ml/min) et d'insuffisance respiratoire sévère, **DATRAMOL®** n'est pas recommandée.
- **DATRAMOL®** peut provoquer une somnolence. La prise d'alcool pouvant aggraver la somnolence, il est préférable de ne pas boire d'alcool pendant le traitement par **DATRAMOL®**.

Grossesse, allaitement et fertilité : **DATRAMOL®** ne doit pas être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement. **DATRAMOL®** n'a pas d'influence sur la fertilité de l'homme ou de la femme.

Conduite de véhicules et utilisation de machines **DATRAMOL®** peut provoquer une somnolence et peut donc perturber la capacité à conduire ou à utiliser des outils ou machines.

ANTIDOULEURS



PAS DE TEMPS POUR LA DOULEUR

- un excellent remède pour le traitement de la douleur modérée à sévère
- bien toléré
- le plein potentiel analgésique dans la combinaison retarde le passage aux opioïdes forts
- indiqué chez les adultes et adolescents de plus de 12 ans

Les avantages de DATRAMOL®*

- un spectre analgésique plus large
- un profil pharmacocinétique complémentaire
- un effet analgésique synergique
- plus de confort
- une meilleure compliance
- un meilleur rapport efficacité / effets indésirables

**Journal of Pain Research 2012;5 327-346*

ACTIVITÉ PUISSANTE ET RAPIDE

Améliorez la qualité de vie
des patients handicapés par la douleur

pas besoin d'eau pour la prise

Pour le RCP complet, consultez www.dafrapharma.com